

saniblend^{rtu}

CITRON NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉTERGENT-DÉSODORISANT-FONGICIDE



CODE: SRTL DIN 02344904

DESCRIPTION: Nettoyant, Désinfectant, Détergent, Désodorisant, Fongicide (contre les champignons pathogènes), Contrôle de moisissures (sur les surfaces dures inanimées non poreuses)

INGRÉDIENTS ACTIFS:

Chlorure de n-Alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) Diméthyl Benzyl Ammonium: 0,105% p/p

Chlorure de n-Alkyl (68% C12, 32% C14) Diméthyl Éthyl Benzyl Ammonium: 0,105% p/p

SANIBLEND RTU LEMON CLEANER - DISINFECTANT - DETERGENT - DEODORIZER - FUNGICIDE a été spécialement conçu comme **nettoyant non acide et désinfectant** pour utilisation dans les hôpitaux, maisons de soins, écoles, hôtels et restaurants, les établissements de traitement des aliments industriels et institutionnels, les chenils, les cliniques hôpitaux vétérinaires. Il a été formulé pour **désinfecter les surfaces dures non poreuses** comme les sols, murs, les surfaces métalliques, l'acier inoxydable, la porcelaine, la céramique, les surfaces plastiques, les salles de bains, douches, baignoires et placards. Pour les surfaces peintes ou en plastique, faire un essai préliminaire avant d'appliquer sur toute la surface. Rincer à l'eau potable les surfaces en contact direct avec des aliments. De plus, ce produit **désodorise** les endroits généralement difficiles à maintenir frais comme les lieux d'entreposage des poubelles, les sous-sols, les toilettes et tous autres lieux sujets aux odeurs causés par des micro-organismes.

MODE D'EMPLOI POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS:

Enlever le gros des saletés et les souillures importantes. **NETTOYAGE:** Vaporiser ou appliquer le produit et essuyer. Aucun frottement n'est nécessaire. **NETTOYAGE EN PROFONDEUR:** Laisser reposer quelques minutes avant d'essuyer. **DÉSINFECTION, DESODORISATICON:** Vaporiser ou appliquer le produit de façon à bien mouler toute la surface. Laisser reposer de 30 sec à 10 min avant d'essuyer. **DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS D'AVICULTURE:** Pour désinfecter les équipements d'aviculture pré-nettoyés (couveuses, abreuvoirs, mangeoires): Retirer toutes les volailles et les aliments des lieux, camions, poulaillers et cages. Enlever toutes litières et déjections des sols, murs et surfaces des lieux occupés ou traversés par les volailles. Vider toutes les auges, mangeoires et autres équipements d'alimentation et abreuvement. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincer à l'eau. Saturer les surfaces avec la solution désinfectante pendant 10 minutes. Ventiler les bâtiments, les poulaillers et autres espaces clos. Ne pas faire entrer les volailles ou utiliser les équipements tant que le traitement n'a pas été absorbé ou séché. Tous les équipements doivent être rincés avec de l'eau potable avant réutilisation. **DÉSINFECTION DES CHENILS ET ABRIS DESTINÉS AUX ANIMAUX: LORS DES TESTS EFFECTUÉS SELON LE PROTOCOLE, L'EFFICACITÉ VIRUCIDALE DES DÉSFECTANTS À UTILISER SUR SURFACES DURES INANIMÉES, LES TESTS D'EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE CE PRODUIT EST EFFICACE CONTRE LE PARVOVIRUS CANIN EN PRÉSENCE SUR SOL ORGANIQUE (5% SÉRUM BOVIN FOETAL):** Pour désinfection des chenils et abris pré-nettoyés destinés aux animaux. Retirer toutes les animaux et les aliments des lieux, camions et cages. Enlever toutes litières et déjections des sols, murs et surfaces des lieux occupés ou traversés par les animaux. Vider toutes les auges, mangeoires et autres équipements d'alimentation et abreuvement. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincer à l'eau. Saturer les surfaces avec la solution désinfectante pendant 10 minutes. Ventiler les bâtiments et autres espaces clos. Ne pas faire entrer les animaux ou utiliser les équipements tant que le traitement n'a pas été absorbé ou séché. Tous les équipements doivent être rincés avec de l'eau potable avant réutilisation. **DÉSINFECTANT DE QUALITÉ HOSPITALIÈRE.** Ce produit ne devrait pas être utilisé comme stérilisant ou désinfectant de haut niveau sur une surface ou un instrument qui: 1) est introduit directement dans le corps humain, soit dans la circulation sanguine ou en contact avec la circulation sanguine, ou des parties du corps habituellement stériles, ou 2) qui être en contact avec des membranes muqueuses intactes, mais qui, normalement, ne pénètre pas la barrière sanguine ou n'est pas introduite dans des parties du corps habituellement stériles, Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage préalable ou la décontamination d'instruments médicaux semi critiques ou critiques avant leur stérilisation ou leur désinfection de haut niveau.

Ce produit est compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses. Effectuer un test sur une zone peu visible avant utilisation, en particulier sur les surfaces en plastique, peintes ou vernies. Ne pas utiliser sur le bois, le plastique plexiglas, le laiton, la pierre naturelle, toute surface endommagée ou fissurée, le cuir ou tout autre surface poreuse. Pour les surfaces où les liquides peuvent causer des dommages, vaporiser le produit sur un chiffon propre ou un essuie-tout et essuyer la surface. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer. Aérer les espaces dos si nécessaire. Ce produit ne doit pas être utilisé pour nettoyer les ustensiles, les verres et la vaisselle. Les surfaces pouvant être en contact direct avec des enfants en âge d'exploration buccale ou des animaux, doivent être soigneusement rincées à l'eau potable avant réutilisation, Éviter la contamination des aliments pendant l'emploi et le stockage.

ALLÉGATIONS BACTÉRICIDES: Ce produit, lorsqu'utilisé comme indiqué, présente des propriétés bactéricides efficaces contre: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Escherichia coli 0157:H7, Corynebacterium ammoniagenes, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Yersenia enterocolitica, Salmonella (typhi) enterica, Enterococcus faecalis résistant au Vancomycin, Staphylococcus aureus résistant au Vancomycin, Staphylococcus aureus résistant au Methicillin, Staphylococcus aureus (VISA), Streptococcus pyogenes (Necrotizing Fasciitis), Staphylococcus epidermidis résistant à la méthicilline (MRSE) et Souches communautaires de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline (CA-MRSA) et répond aux critères de qualité hospitalière.

ALLÉGATIONS TUBERCULOCIDES: Ce produit présente des propriétés tuberculocides efficaces contre Mycobacterium terrae quand la surface traitée reste mouillée pendant 5 minutes.

ALLÉGATIONS FONGICIDES: Ce produit présente des propriétés fongicides efficaces contre le champignon Trichophyton interdigitale (champignon du pied d'athlète) quand la surface traitée reste mouillée pendant 10 minutes.

En cas d'urgence chimique seulement, appeler CANUTECH 1-613-996-6666

Chemotec (P.M.) Inc, 8820 Place Ray Lawson, Anjou, Quebec, H1J 1Z2.

QUESTIONS/COMMENTAIRES? Tel: 1-514-729-6321 / 1-800-729-6321, Fax: 1-514-729-6322, service@safblend.com, www.safblend.com



CONTRÔLE DE MOISSISSURES: Pour contrôler la moisissure sur les surfaces dures non poreuses pré-nettoyées, vaporiser la surface à traiter en veillant à bien mouiller toute la surface. Répéter l'application chaque semaine, ou quand la moisissure réapparaît.

ALLÉGATIONS VIRUCIDES: Ce produit, lorsqu'utilisé comme indiqué sur les surfaces dures non poreuses, présente des propriétés virucides efficaces contre: le VIH-1, l'hépatite C (HCV), le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV), le coronavirus humain, l'hépatite A, le virus de Norwalk, le Calicivirus félin, le virus de la rage, le parvovirus canin, le poliovirus de type 1, le virus de la grippe aviaire A, dindon/Wisconsin/(H9N2), l'influenza aviaire (H3N2), le Paramyxovirus, le Rotavirus, le Rhinovirus type 39 et le Coronavirus associé au SRAS.

TUE LE VIH-1 ET LE VHC SUR LES SURFACES DURES (objets) pré-nettoyés, précédemment contaminés par du sang/des liquides organiques, dans les établissements de santé (hôpitaux, centres de soins) ou autres établissements dans lesquels la contamination des surfaces dures (objets) avec du sang ou des liquides organiques est probable et pour lesquels les surfaces ou objets risquant d'être contaminés de sang ou de liquides organiques peuvent être associés à la transmission possible du Virus d'Immunodéficience Humaine de type 1 (VIH-1) et le Virus de l'Hépatite C (VHC).

Directives particulières pour nettoyer et décontaminer contre le VIH-1 et le VHC les surfaces/objets souillés de sang ou de liquides organiques: Protection individuelle: Pour manipuler des objets souillés de sang ou de liquides organiques, porter des gants en latex jetables, une blouse, un masque ou des lunettes.

Procédure de nettoyage: Les surfaces visées doivent être nettoyées avant la désinfection, puisque la présence de souillures importantes sur une surface pourrait réduire l'efficacité recherchée du produit. **Durée de contact/taux de concentration:** Appliquer le produit sur la surface et laisser le produit agir et rester humide pendant 10 minutes. **Élimination des matières infectieuses:** Tout matériel utilisé pour le nettoyage qui pourrait contenir du sang ou des liquides organiques, doit être éliminé immédiatement conformément aux règlements locaux d'élimination des matières infectieuses.

Ce produit a démontré son efficacité contre le virus de la grippe aviaire A et devrait inactiver tous les virus de la grippe A, y compris le virus de la grippe pandémique A 2009 (H1N1).

CE PRODUIT TUE LE SRAS-COV-2 (LE VIRUS QUI CAUSE LA COVID-19) EN 1 MINUTE.

PROFIL ENVIRONMENTAL:

- **Sans phosphate**, ce qui contribue à réduire la pollution des lacs et rivières.
- **Sans ammoniac, sans javélsant**
- **Biodégradable** selon le standard OCDE 301
- Contenant **recyclable**
- **Classification en vertu du TMD:** non réglementé

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGER - PROVOQUE UNE IRRITATION MODÉRÉE DES YEUX. Éviter le contact avec les yeux ou Les vêtements. Bien se laver à l'eau et au savon après toute manipulation.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les YEUX : Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact éventuels, si possible facilement, et continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas de contact avec la PEAU: Rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'INHALATION: Respirer de l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes persistent. En cas d'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement. Pour la consultation médicale, amener avec vous le contenant, l'étiquette, ou le nom du produit et son Identification Numérique de Droque (DIN).

ENTREPOSAGE: Conserver dans le contenant d'origine, soigneusement fermé en position verticale. Protéger du gel. **ÉLIMINATION:** Le contenant peut être rempli avec le même produit. Ne pas réutiliser le contenant pour autre chose. Rincer le contenant vide et recycler. Pour toute information sur l'élimination des produits non utilisés ou superflus, communiquer avec le fabricant, l'organisme de réglementation municipal/provincial/territorial ou un organisme de gestion des déchets. L'emballage contient du contenu recyclé post-consommation.

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique	Liquide	Vitesse d'évaporation (nBuAc=1)	0.4 (eau)
Couleur	Jaune	%Volatile (%Poids)	≤1
Odeur	Odeur de citron	Pression de vapeur (mm Hg)	20 mm Hg (eau)
Seuil d'odeur (ppm)	S/O	Densité de vapeur (Air = 1)	0.6 (eau)
pH	Approximativement 11.7	Densité (eau = 1 at 4°C):	1.0 g/cm ³ @ 20°C
Point de congélation	Approximativement 0°C	Solubilité dans l'eau	Miscible
Point d'ébullition	Approximativement 100°C	Viscosité	<100 cps @ 25°C

En cas d'urgence chimique seulement, appeler CANUTEC 1-613-996-6666

Chemotec (P.M.) Inc, 8820 Place Ray Lawson, Anjou, Quebec, H1J 1Z2.

QUESTIONS/COMMENTAIRES? Tel: 1-514-729-6321 / 1-800-729-6321, Fax: 1-514-729-6322, service@safblend.com, www.safblend.com